

{rokbox title=|Blanquizales :: Image: Authors|
thumb=|images/stories/ieo/imagenespublicaciones/centro-oceanografico-baleares-estacion-jaume-ferrer-ieo-csic-divulga-blanquizales-cardona-et-al-2024-thumb.jpg|images/stories/ieo/imagenespublicaciones/centro-oceanografico-baleares-estacion-jaume-ferrer-ieo-csic-divulga-blanquizales-cardona-et-al-2024.jpg{/rokbox}

Cardona L., **Reñones O.**, **Cefalì ME.**, Sales M., Gouraguine A., Hereu B., **Quetglas A.**, **Moranta J.**,
2024.

[Blanquizales del norte de Menorca](#)

;
Instituto Español de Oceanografía (IEO), CSIC. Programas de Seguimiento Científico de la Estación de Investigación Jaume Ferrer, 16 pp. <https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/16150>

Abstract: Los blanquizales son zonas de substrato rocoso recubiertas por algas coralináceas incrustantes, que emergen cuando desaparecen los bosques arborescentes más densos formados por algas pardas. Los blanquizales y los bosques de algas pardas se corresponden con los dos estados ecológicos alternos que se pueden encontrar en los fondos rocosos infralitorales de las zonas templadas. La principal causa de cambio entre un estado y otro se ha atribuido a variaciones en la intensidad del ramoneo de los erizos de mar, uno de los principales herbívoros de la zona litoral en las regiones templadas y frías.

Keywords: