

{rokbox title=|Alga parda *Gongolaria* :: Image: Authors|
thumb=|images/stories/ieo/imagenespublicaciones/centro-oceanografico-baleares-estacion-jau
me-ferrer-ieo-csic-divulga-gongolaria-sales-et-al-2024-thumb.jpg|images/stories/ieo/imagenesp
ublicaciones/centro-oceanografico-baleares-estacion-jau-me-ferrer-ieo-csic-divulga-gongolaria-s
ales-et-al-2024.jpg{/rokbox}

Sales M., **Gran A.**, **Movilla J.**, Ballesteros E., Cebrián E., Verdura J., **Bolado I.**, **Quetglas A.**,
Cefalì ME.
, 2024.

[Restauración del alga parda
Gongolaria barbata](#)

:-
Instituto Español de Oceanografía (IEO), CSIC. Programas de Seguimiento Científico de la
Estación de Investigación Jaume Ferrer, 28 pp. <https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/16162>

Abstract: Las macroalgas del género *Cystoseira sensu lato* (comprendiendo los géneros *Ericaria*
a , *Gongolaria*
y
Cystoseira
) forman hábitats estructuralmente complejos en las zonas rocosas del piso infralitoral y
circalitoral superior, cualidad que les confiere la denominación de bosques submarinos. Estas
especies están involucradas activamente en la producción primaria costera y proporcionan
alimento, refugio y un nicho ecológico para muchos otros organismos de algas, invertebrados y
peces.

Keywords: